

Bijlage 3: overzicht vaccinatiegraad voor verschillende vaccins

- In 2011 werd gerapporteerd over de vaccinatietoestand voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen en dat geeft zoals andere jaren weer een vergelijkbaar gunstig beeld. Voor zuigelingen lag de deelname aan de DKTP-vaccinatie op 95,4%, aan de Hib-vaccinatie op 96,0% en aan de pneumokokkenvaccinatie op 94,8%; dat is (ruim) boven de Nederlandse norm van 90%. Van de peuters kreeg 95,9% de meningokokken C-vaccinatie en eveneens 95,9% de BMR- vaccinatie. De WHO-norm voor mazelen (95%), nodig voor de eliminatie van mazelen, wordt voor de tweede BMR-vaccinatie op negen jaar nog niet gehaald.
- Voor HPV ligt de vaccinatietoestand op een heel ander niveau. Voor de jaargroepen 1993 tot en met 1996 uit de inhaalcampagne, vastgesteld op 1 februari 2011 nadat hun de laatste herkansing was geboden, bedraagt deze gemiddeld 52,3%, 49,0% voor cohort 1993, 52,5% voor cohort 1994, 53,8% voor cohort 1995 en 54,2% voor cohort 1996. De vaccinatietoestand voor de eerste groep 12-jarige meisjes die in het reguliere RVP werden gevaccineerd (cohort 1997) zal in 2012 worden gerapporteerd. Wel is voor cohort 1997 het opkomstcijfer bekend (wederom voor volledige serie van drie doses, maar wel bepaald met een andere systematiek dan voor de vaccinatiegraad) en dat wijst op een positieve trend: 57,6%; voor jaargroep 1998 is dit 53,3% terwijl 7,5% van de meisjes die al twee prikken hebben gekregen nog een kans hebben om de serie dit voorjaar te completeren. HPV-vaccinatie richt zich overigens vooralsnog primair op individuele bescherming en niet op groepsimmunitet.